

## ALCUNI *TROCHUS* DEL MAR ROSSO

per Dott. J. BISACCHI

---

Nella presente nota ho riunito i *Trochus* pescati nel Mar Rosso in parte dal Prof. Arturo Issel e dal Dott. Odoardo Beccari nel 1870, in parte dal Prof. Luigi Sanzo durante la Crociera Idrografica compiuta nel 1923-1924 con la R. N. « Ammiraglio Magnaghi ».

Tra questi annovero una nuova specie, *Trochus (Gibbula) Hornungi*, che ho il piacere di dedicare al Signor Antoine Hornung di Ginevra, studioso della malacofauna del Mar Rosso.

### Famiglia **TROCHIDAE**

Genere **TROCHUS** (Rondelet 1554) Linneo 1758.

**Trochus (Cardinalia) virgatus** Gmelin (non Menche) in Kiener, Icon. Coq. Viv., 1873, vol. IV-V, pag. 97, tav. 27, fig. 1; tav. 28, fig. 1.

(*granulata* Chemn.).

Mar Rosso (Collezione Coen).

**T. (Tectus) dentatus** Forskal (non Gmel.) in Kiener, l. c., pag. 86, tav. 20.

(*pyramidalis* Lk.; *foveolatus* Gmel.).

Suez (Issel, 1870).

Massaua (Issel e Beccari, 1870. Vinciguerra, 1901. Pescata nel porto a 11 m. di profondità, L. Sanzo, 4-XI-1923).

Gherar (lungo la costa, Marcacci Com.<sup>te</sup> della R. N. « Scilla », 2-XII-1893).

Is. Sarato (Issel e Beccari, 1870).

Questa specie è pescata attivamente perchè riceve applicazioni industriali.

**T. (Tectus) noduliferus** Lamarck in Kiener, l. c., pag. 87, tav. 2, fig. 1.

Piccolo Lago Amaro (Issel, 1870. L. Sanzo, 1923).

Suez (nel porto in una pesca di fondo con tramaglio a m. 6, L. Sanzo, 28-29-V-1924).

Arc. Farasan (ad ovest, L. Sanzo, 22-I-1924).

Is. Dahalac (raccolta lungo la spiaggia, L. Sanzo, 23-II-1924).

Assab (con reti di fondo a m. 12, L. Sanzo, 20-IV-1924).

Is. Perim, a Sud-Est (L. Sanzo, 5-V-1924).




Fig. 1. Denti della radula di *Trochus noduliferus* Lk.

Alcuni esemplari di questa specie erano conservati in formalina a forte percentuale che aveva indurito i tessuti del mollusco. Posso quindi dare soltanto la figura della radula.

**T. (Tectus) mauritianus** Gmelin in Kiener, l. c., pag. 91, tav. 25, fig. 1.

(*muricatus* Chemn.; *crenulatus* Lk. (non Brocchi, nec Reeve); *costifer* Jonas).

Mar Rosso (Coll. Coen).

**T. (Polydonta) maculatus** Linneo in Kiener, l. c., pag. 101, tav. 29, fig. 1-1 a.

(*vernus* Gmel.; *sanguinolentus* Chemn.; *Gmelini* Jonas; *altus* Reeve; *verrucosus* Gmel.).

Massaua (Issel e Beccari, 1870).

Is. Dahalac (raccolta lungo la spiaggia, L. Sanzo, 23-II-1924).

**T. (*Infundibulum*) *erythraeus*** Brocchi in Kiener, l. c., pag. 111, tav. 33, fig. 2.

(*Kochii* Kiener (non Phil.); *magus* Forskal; *fictilis* Jonas; *crebriliratus* Jonas).

Il materiale conservato in formalina mi ha permesso anche per questa specie di osservare soltanto la radula.



Fig. 2. Denti della radula di *Trochus erythraeus* Brocchi.

Ismailia (dal mercato locale dragata sul fondo a m. 7, L. Sanzo, 2-VI-1924).

Ras-el-Ech (nel canale di Suez, con reti di fondo da 0-8 m., L. Sanzo, 8-X-1923).

Piccolo Lago Amaro (L. Sanzo, 1923).

Suez (pesca costiera nel porto, a sinistra della zona di passaggio dei piroscafi, L. Sanzo, 28-V-1924; e dragati sul fondo a m. 6, L. Sanzo, 29-V-1924).

Suakim (Issel, 1870).

Massaua (Issel e Beccari, 1870. Nel porto con reti di fondo a m. 11, L. Sanzo, 12-I-1924).

Is. Dahalac (lungo la spiaggia, L. Sanzo, 23-II-1924).

Is. Sarato (Issel, 1870).

Is. Aucan (materiale spiaggiato da 0 a 20 m. di profondità, L. Sanzo, 23-XI-1923).

Is. Adjuz (sulla spiaggia, L. Sanzo, 10-X-1923).

Ras Andadd (L. Sanzo, 16-XI-1924).

Is. Gebel-Zukur (a sud, L. Sanzo, 6-I-1924).

**T. (Clanculus) pharaonius** Linneo in Kiener, l. c., pag. 165, tav. 56, fig. 1.

Suez (in una pesca costiera nel porto, L. Sanzo, 30-V-1924).

Massaua (pesca planctonica di fondo vicino alla banchina del porto, 0-9 m. di profondità, L. Sanzo, 19-II-1924).

Is. Dahalac (lungo la spiaggia, L. Sanzo, 23-II-1924).

Is. Aucan (sulla spiaggia, L. Sanzo, 23-XI-1923).

Is. Adjuz (al largo, con sciabica tramaglio, da 0-11 m. di profondità, L. Sanzo, 10-IX-1923).

Ras Beilul (sulla spiaggia, L. Sanzo, 1-II-1924).

Baia di Assab (Com. Sapelli).

Is. Perim, a Sud-Est (con reti planctoniche in serie, da 0 a 300 m., L. Sanzo, 5-V-1924).

Varietà: **puniceus** Philippi, Zeitschr. Malak., 1846, pag. 100.

Mar Rosso (Issel, 1870).

**T. (Monodonta) dama** Philippi in Kiener, l. c., pag. 360, tav. 111, fig. 2.

Suez (Issel, 1870). Nel porto, dragati sul fondo a m. 6, L. Sanzo, 28-V-1924).

**T. (Monodonta) australis** Lamarck in Kiener, l. c., pag. 227, tav. 74, fig. 1-2.

(*melanchlorus* Phil.).

Massaua (Issel e Beccari, 1870).

Ras Beilul (lungo la spiaggia, L. Sanzo, 1-II-1924).

Assab (Issel e Beccari, 1870).

Ras Dumeirah (Issel, 1870).

**T. (Monodonta) canaliferus** Lamarck in Kiener, pag. 225, tav. 73, fig. 2-3.

Assab (Issel e Beccari, 1870).

**T. (Isanda) Hemprichi** Issel, Malacologia del Mar Rosso, 1869, pag. 223. — Savigny, Descript. de l'Égypte, Coq. tav. III, fig. 6.

Credo opportuno ridare il disegno della *Hemprichi* essendo poco chiara la fig. 6 dell'opera di Savigny.

Suez (Issel, 1870).

Massaua (Collezione Coen).




Fig. 3. *Trochus Hemprichi* Issel.

**T. (Ethalia) minolinus** Melvill, Memoirs Proceedings Manchester Society, 1897, vol. XIII, pag. 20, tav. VII, fig. 24.

Massaua (a 5 m. di profondità, Issel, 1870).

**T. (Umbonius) lineolatus** Lamarck in Kiener, l. c., vol. VI, Genere *Rotella*, pag. 3, tav. 1, fig. 1 a - f. (*vestiarius* L.).

Massaua (Issel, 1870).

**T. (Gibbula) Hornungi** n. sp.

*Conchiglia* piccola, solida, conica, di altezza variabile con apice ottuso.

*Umbilico* largo, profondo, internamente scolpito da fitti solchi longitudinali, attraversati da incisure concentriche.

*Anfratti* 5  $\frac{1}{2}$ , convessi, leggermente appianati presso la sutura, privi di qualsiasi scultura, fatta eccezione a piccolissime linee di accrescimento appena visibili colla lente.

*Base* convessa, percorsa da striature raggiate che originandosi all'umbilico vanno scomparendo verso la circonferenza della conchiglia.

*Colore* bianco con protoconchiglia violacea o rossiccia e un




Fig. 4. *Trochus Hornungi* n. sp.

alone della stessa tinta che circonda l'ombelico, anfratti percorsi longitudinalmente da irregolari raggi violacci o rossicci che nell'ultimo giro arrivano soltanto alla circonferenza della conchiglia.

*Columella* semplice, obliqua, curva nella sua parte superiore.

*Apertura boccale* irregolarmente romboide con labbro semplice acuto.

*Altezza* mm. da 4 a 4  $\frac{1}{2}$ .

*Diametro* mm. da 4  $\frac{1}{2}$  a 5.

Is. Sarato (Issel 1870).

**T. (Forskalia) declivis** Forskal in Kiener, l. c., pag. 126, tav. 43, fig. 3.

(*aegyptiacus* Chemn.).

Suez (nel porto, dragato sul fondo, L. Sanzo, 29-V-1923).

**T. (Minolia) nedymus** Melvill, Memoirs Manchester Literary Philosophical Soc., 1896, vol. XLI, pag. 17, tav. 7, fig. 23.

Massaua (e suoi dintorni a 15-30 m. di profondità, Issel e Beccari, 1870).

**T. (Vanitrochus) holdsworthiana** Nevill, Journal Asiatic Soc. Bengal, 1871, pag. 3, tav. 1, fig. 18.

(*variabilis* Adams; *Pantanelli* Caramagna).

Suez (Issel, 1870).

**T. (Priotrochus) obscurus** Wood in Philippi, Abbildungen Beschreibung Conchylien, 1847, parte II, pag. 26, tav. IV, fig. 3.

Massaua (e suoi dintorni, Issel, 1870).

**T. (Umbonella) Sismondae** Issel in Bisacchi, Annali Museo Civico Storia Naturale, Genova, 1931, Vol. LV, pag. 165, fig. 4-5.

Suez (Issel, 1870).

Massaua (Issel e Beccari, 1870).

Is. Dahalac (Issel e Beccari, 1870).

Is. Sarato (Issel e Beccari, 1870).

**T. (Margarita) biangulosus** A. Adams, Proceedings Zoological Society London, 1854, pag. 40.

Massaua (Issel, 1870).

**T. (Turcica) stellata** A. Adams, Proceedings Zoological Society London, 1863, pag. 508.

Suez (Issel, 1870).

**T. (Euchelus) pullatus** Anton in Kiener, l. c., pag. 407, tav. 120, fig. 1.

Mar Rosso (R. N. « Scilla », Com. Cassanello, 1892).

Massaua (Issel e Beccari, 1870).

Aden (Issel, 1870).

**T. (Euchelus) denigratus** Chemnitz in Kiener, l. c., pag. 293, tav. 94, fig. 3.

(*atratus* Gmel., *canaliculatus* Lk.).

Mar Rosso (Issel, 1870).

Massaua (Issel e Beccari, 1870).

**T. (Euchelus) bicinctus** Philippi, Zeitschr. Malakozool., 1848, pag. 102.

Ismailia (pesca con draga a m. 7 di profondità, L. Sanzo, 2-VI-1924).

Suez (nel porto, dragati sul fondo, L. Sanzo, 28-V-1924).

Massaua (nel porto pescati con nassa, 0-9 m. di profondità, L. Sanzo, 12-III-1924).